

## Dénomination du médicament

### **DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales Di-iséthionate d'hexamidine**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?
3. Comment utiliser DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antiseptique - code ATC : S03AA05

Ce médicament est une solution antiseptique pour instillation dans le nez.

Il est préconisé dans le traitement des infections du nez.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?

**N'utilisez jamais DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales :**

- si vous êtes allergique au di-iséthionate d'hexamidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales.

**Faites attention avec DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales :**

- Refermer soigneusement le flacon après usage.
- Ne pas utiliser en même temps certains médicaments contenant un antiseptique.
- L'usage prolongé (plus de 10 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel du nez.

### **Enfants**

Il n'existe pas d'utilisation justifiée de DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales dans la population pédiatrique.

### **Autres médicaments et DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales avec des aliments**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales contient du borax et de l'acide borique.**

## 3. COMMENT UTILISER DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie**

La dose recommandée est de 4 à 6 instillations par jour dans chaque narine.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Si vous avez utilisé plus de DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales que vous n'auriez dû :**

En cas de surdosage (utilisation répétée excessive), les symptômes peuvent inclure des picotements, des irritations ou des brûlures nasales. Une irrigation nasale avec du sérum physiologique est recommandée.

**Si vous oubliez d'utiliser DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Irritation transitoire et réactions allergiques.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 30 jours après ouverture du flacon.

Noter la date d'ouverture en clair sur l'emballage.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

**Ce que contient DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales**

- La substance active est :

Di-isethionate d'hexamidine ..... 100,0 mg  
Pour 100 mL de solution.

- Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, acide borique, borax, eau pour préparations injectables.

**Qu'est-ce que DESOMEDINE 0,1 %, solution pour pulvérisations nasales et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisations nasales.

Flacon de 10 mL.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

416, RUE SAMUEL MORSE - CS 99535  
34961 MONTPELLIER

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

416, RUE SAMUEL MORSE - CS 99535  
34961 MONTPELLIER

**Fabricant**

**LABORATOIRE CHAUVIN**

ZONE INDUSTRIELLE DE RIPOTIER  
50 AVENUE JEAN MONNET  
07200 AUBENAS

ou

**DR GERHARD MANN CHEM. PHARM. FABRIK GMBH**

BRUNSBÜTTLER DAMM, 165/173  
13581 BERLIN  
ALLEMAGNE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**{mois AAAA}**.

#### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).